



**MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII  
RURALE**

**AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BRĂILA**

Str..Calea Călărașilor .nr..50 .

Telefon: -

Loc. Brăila , Jud. Brăila e-mail [ofbraila@anof.ro](mailto:ofbraila@anof.ro)

**BULETIN DE AVERTIZARE  
NR. 11/12.06.2020**

Precipitațiile înregistrate în ultima perioadă, au creat condiții foarte favorabile apariției atacului de mană la ceapă – *Peronospora destructor*. Ca urmare, recomandăm efectuarea de tratamente la culturile de ceapă, înființate atât prin semănat direct, cât și prin plantare de arpagic, folosind unul din produsele fungicide omologate:

ALIETTE 80 WG	– 2,0 kg/ha
BOUILLIE BORDELAISE WDG	– 7,5 kg/ha
FOLPAN 80 WDG	- 0,15%
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	– 2,5 kg/ha
ORTIVA TOP	-1,0 l/ha

**RECOMANDĂRI:**

- Se pot folosi și alte produse omologate la ceapă.
- Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt;
- Respectați regulile de manipulare și administrare a produselor de protecție a plantelor;
- În soluția de stropit se poate adăuga un insecticid, pentru prevenirea atacului unor dăunători specifici (musca cepei – *Delia antiqua*, tripsul tutunului – *Thrips tabaci*), cum ar fi: MAVRIK 2 F - 0,05%, MOSPILAN 20 SG – 0,2 kg/ha și.a.
- În soluția de stropit se va adăuga obligatoriu un „adeziv”, (Trend, Aracet).
- Culturile de arpagic sunt foarte „receptive”, la atacul de mană. Bulbii de arpacig, infectați de mană, sunt o cale foarte importantă de transmitere a bolii, de la un an la altul, constituind în același timp și o sursă primară de infecție foarte importantă, pentru declanșarea atacului, în anii favorabili atacului de mană.
- Dacă se intenționează administrarea unui produs erbicid, acesta se va aplica separat de produsele fungicide și insecticide menționate și, în acest caz, nu se va adăuga adeziv în soluția de erbicidare.
- Se va respecta, cu strictete, intervalul de pauză dintre ultimul tratament și recoltarea cepei, în cazul în care aceasta se comercializează ca ceapă verde! De exemplu, produsul RIDOMIL GOLD MZ 68 WG are, în cazul aplicării la ceapă, un interval de pauză de 28 zile!
- Recuperați ambalajele goale, protejați familiile de albine și mediul!

Dr. ing. Eugen Velichi

