



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BRĂILA

Str..Calea Călărașilor .nr..50 .

Telefon: -0239698326

Loc. Brăila , Jud. Brăila e-mail fitobrăila@yahoo.com

524/O/24.05.2017

BULETIN DE AVERTIZARE

NR. 14/24.05.2019

Pentru prevenirea atacului de monilioză – *Monilinia* sp. și de musca cireșelor –*Rhagoletis cerasi*, recomandăm efectuarea la cireș și vișin, a unui tratament de siguranță, cu una din următoarele combinații de produse fungicide și insecticide omologate:

TOPSIN 70 WDG	-0,07%	+LASER 240 SC	-0,06%
BOUILLIE BORDELAISE WDG- 5,0 kg/ha		+CALYPSO 480 SC	-0,02%
SCORE 250 EC	-0,2 l/ha	+DECIS MEGA 50 EW	-0,015%
DITHANE M-45	-0,20%	+NOVADIM PROGRESS	-0,075 l/ha

RECOMANDĂRI:

- Se pot folosi și alte produse omologate la cireș.
- Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt.
- Respectați regulile de manipulare și administrare a produselor de protecție a plantelor.
- În soluția de stropit adăugați un „adeziv,, (de ex. Trend).
- Soiurile de cireș semitardive și tardive s-au dovedit mai sensibile la atacul acestui dăunător și aici menționăm: Bigarreau Napoleon, Germerzdorfer, Bigareau Jaune Dönisen, Hedelfingen, Boambe de Cotnari, Regina, Pietroase negre, ș.a.
- În unii ani atacul muștei cireșelor a produs pagube de 80 – 100% la soiurile cu maturitate tardivă.
- Se va respecta, cu strictețe, intervalul de pauză dintre ultimul tratament și recoltare, în funcție de combinația de produse utilizată mai ales la soiurile mai timpurii.
- Recuperați ambalajele goale, protejați familiile de albine, conform Legii 383/2013, precum și mediul!

Dr. ing. Eugen Velichi

