



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII  
RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BRĂILA

Str..Calea Călărașilor .nr..50 .

Telefon: -

Loc. Brăila , Jud. Brăila e-mail [fitobrăila@yahoo.com](mailto:fitobrăila@yahoo.com)

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
**NR. 13/8.07.2020**

Precipitațiile înregistrate în ultima perioadă, au creat condiții, foarte favorabile, apariției atacului de mană la ceapă produs de ciuperca *Peronospora destructor*. Ca urmare, recomandăm efectuarea de tratamente la culturile de ceapă înființate prin semănat direct:

ALIETTE 80 WG	- 2,0 kg/ha
BOUILLIE BORDELAISE WDG	- 7,5 kg/ha
FOLPAN 80 WDG	- 0,15%
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	- 2,5 kg/ha
ORTIVA TOP	-1,0 l/ha

**RECOMANDĂRI:**

- Se pot folosi și alte produse fungicide omologate la ceapă.
- Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt;
- Respectați regulile de manipulare și administrare a produselor de protecție a plantelor;
- În soluția de stropit se poate adăuga un insecticid, pentru prevenirea atacului unor dăunători specifici (musca cepei – *Delia antiqua* G II, tripsul tutunului – *Thrips tabaci*), cum ar fi: MAVRIK 2 F - 0,05%, MOSPILAN 20 SG – 0,2 kg/ha, ș.a.
- În soluția de stropit se va adăuga obligatoriu un „adeziv,, (Trend, Aracet).
- Dacă se intenționează administrarea unui produs erbicid, acesta se va aplica separat de produsele fungicide și insecticide menționate și, în acest caz, nu se va adăuga adeziv în soluția de erbicidare.
- Se va respecta, cu strictete, intervalul de pauză dintre ultimul tratament și recoltarea cepei, mai ales în cazul în care aceasta se va comercializa și cu frunze, înainte de maturitatea deplină (ceapă uscată)! De exemplu, produsul RIDOMIL GOLD MZ 68 WG are, în cazul aplicării la ceapă, un interval de pauză de 28 zile!
- Recuperați ambalajele goale, protejați familiile de albine și mediul!

Dr. ing. Eugen Velichi

