

OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245
ofmures@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr 37/ 14. 07. 2020

I. Condițiile climatice sunt foarte favorabile infecțiilor de mană și alte boli la legume și cartofi (mana ceapă, mana și septorioza la tomate, mana la vinete, antracnoză, bacterioză la fasole și castraveti, mana cartof). Recomandăm să se aplice tratamente la aceste culturi în perioada imediat următoare folosindu-se unul din următoarele produse: ALCUPRAL 50 PU 0,25%–0,5% sau ACROBAT MZ 69 WG – 2,0 kg/ha sau ARMETIL COBRE (MANOXIN COMBI) – 2,5 kg/ha sau ALIETTE 80 WG - 2,0 kg/ha sau DITHANE M-45 – 0,2- 0,25% (2 - 2,5 kg/ha) sau DITHANE NEOTEC 75 WG (AVTAR 75 NT) - 0,2% sau POLYRAM DF – 0,2% sau TRIUMF 40 WG – 2,0-2,5 kg/ha sau VITRA 50 WP (CUPRIDIN) - 1,5-2,0 kg/ha sau VONDOZEB (MANZATE) – 0,2 – 0,25 %.

II. In aczul prezenței atacului produs de acarieni la legume adăugați în soluția de stropit unul dintre acaricidele: APACHE (VERTAB - 0,15-1,0 L/ha sau ASCLEPIOS 500 SC (APOLLO 500 SC) - 0,04% sau BERMECTINE - 0,15-1,0 l/ha sau NISSORUN 10 WP – 0,4- 1,0 kg/ha sau ORTUS 5 SC – 0,1% Acarienii atacă un număr mare de specii legumicole (ardei, castraveți, vinete, tomate, etc.). Se localizează pe fața inferioară a frunzelor, pe bobocii florali și fructe. Organele atacate se depigmentează, fructele raman mici.

III. La culturile de legume pentru combaterea dăunătorilor (buha verzei, molia verzei, purici, afide legume, gândacul din Colorado etc.) , aplicați tratamente utilizand unul din insecticidele: ALVERDE - 0,1 % sau CORAGEN – 125 - 175 ml/ha sau BENEVIA – 0,126 - 0,75 l/ha.

In cazul legumelor cu frunza lucioasă (varza, ceapa, ardei, etc.) unde aderența apei este scăzută se utilizează obligatoriu adjuvanți, pentru a mări aderența soluției de tratament pe frunză.

Pentru prevenirea apariției fenomenului de rezistență se recomandă utilizarea în alternanță cu fungicide din grupe chimice diferite.

Dacă folosiți produse de contact tratamentele se aplică după 7 zile, iar la cele cu acțiune sistemică tratamentul se efectuează după 10-12 zile.

Pentru tratament se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Citiți și utilizați produsele conform recomandărilor de pe ambalaj.

Nu se vor trata culturile de legume pentru consum curent.

Se va respecta cu strictețe timpul de pauză al fiecărui pesticid.

Tratamentele se vor aplica în orele de dimineață sau seară și temperatura aerului sub 25 °C.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

<http://www.topps-drift.org/?LANG=RO>,

In conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător, împotriva intoxicațiilor cu pesticide!

COORDONATOR,
Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,
Costea Gherghina

