



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures,
Str.Dezrobirii Nr.80

Tel/ Fax:0265.435245
ofmures@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr.26 /12 .05. 2021

Condițiile climatice sunt favorabile producerii infecțiilor cu boli la speciile semănțoase.

Tratamentul să aplică la 7 - 8 zile de la tratamentul efectuat după scuturare petalelor și coincide cu faza fenologică creșterea fructelor.

A) Pentru prevenirea și combaterea bolilor la măr și păr (rapăn, făinare), vă recomandăm să utilizați în soluția de stropit unul dintre următoarele produse de protecția plantelor:

EMBRELIA	Mar, păr	Rapan ,fainare	1,44 l/ha	
QUIMERA	Mar ,păr	Rapanul, făinarea ,stemfilioza parului	0,2 kg/ha	Pauză 35 zile
STROBY DF	Mar, păr	Rapanul, făinarea	0,2 kg/ha	28 zile
POLYRAM DF	Mar Par	Rapanul	0,25%	21 zile
MERPAN 80 WDG (CAPTADIN 80 WDG)	Mar	Rapanul, cancerul deschis al pomilor, boli de depozit	0,15% (2,25 kg/ha în 1500 L apa)	28 zile
	Par	Rapanul, cancerul deschis al pomilor, boli de depozit	2,0 kg/ha în 1000 L apa	28 zile
KUMULUS DF	Mar	Fainarea	0,3%	-
KANTAREL	pomi fructiferi (semințoase)	Fainarea	0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)	14 zile

În caz de atac al dăunătorilor: cotarul brun, afide etc , adăugați în soluția de stropit și un insecticid:

DELTAGRI (FASTER DELTA)	Mar	Viermele merelor, minierul marmorat, afide Inelarul pomilor, cotarul verde, cotarul brun, omida paaroasa, omida mica viespea merelor	0,375-0,4 L/ha	7 zile
	Mar	Molia pielitei fructelor, paduchele lanos al marului, minierul circular al marului, minierul liniar al marului	0,25-0,45 L/ha	7 zile
SIVANTO PRIME 200 SL	Mar	Afide (Aphis pomi, Aphis spiraecola), Dysaphis plantaginea (Paduchele roz galicol al marului), Hoplocampa testudinea (Viespea merelor), Psylla mali (Puricele melifer al marului)	0,9 L/ha în 750-1500 L pa pentru o coroana de 3m	14 zile
MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG)	Mar	Paduchele lanos, afide	0,300 kg/ha (0,02 %)	14 zile
	păr	Puricele melifer al parului	0,200 kg/ha (0,02%)	14 zile

Dacă în cultură semnalăți atac al acarienilor utilizați unul din acaricidele:

NISSORUN 10 WP	Mar	Paijenul rosu al pomilor	0,3 kg/ha	28 zile
	Mar	Acaranul rosu comun	1,0 kg/ha	28 zile
	Par	Paianjenul rosu al pomilor, acaranul rosu comun	1,0 kg/ha	28 zile
ORTUS 5 SC	Mar	acarianul rosu al pomilor	0,10%	

Pentru tratamentele recomandate mai sus se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Efectuați în prealabil testul de compatibilitate.

Volumul mediu de soluție (l/ha) aplicat cu utilaje tereste este la mar,cireș,vișin nuc de 1500 l/ha și 1000 l/ha la păr,gutui,prun,cais,piersic,nectarin,arbuști fructiferi,căpșuni,pepiniere pomicole – în funcție de tipul de livadă și vârsta plantației.

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.

RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ALBINELOR, ANIMALELOR, SI A MEDIULUI INCONJURATOR !

COORDONATOR
Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,
Costea Gherghina