

OFICIUL FITOSANITAR MURES

Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245

ofmures@anf.ro
BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 30 /19.05. 2021

Oficiul Fitosanitar Mureș vă recomandă să aplicați tratamentul III pentru prevenirea și combaterea complexului de boli ale spicului (Fusarium spp., Septoria spp., Cladosporium h. etc.) la cerealele păioase.



Fusarium spp.



Septoria spp



Cladosporium h

Dintre bolile spicului de grâu, una dintre cele mai periculoase este fuzarioza spicelor (Fusarium spp.), cunoscută și sub numele de arsura, înroșirea sau albirea spicelor

Simptomele bolii apar pe spice și pe porțiunea de tulpină situată imediat sub spic.

Spicele infectate își pierd clorofila, se albesc treptat și se usucă. Ele rămân mai mici și erecte comparativ cu cele sănătoase. Boala poate cuprinde spicul parțial sau în întregime. Dacă atacul apare înainte de înflorire, spicele rămân seci, iar când se produce după înflorire, intervine șiștăvirea boabelor

Infecțiile sunt favorizate de ploile frecvente din perioada de la înspicare până la înflorire, precum și temperaturi cuprinse între 21 și 28°C.

Perioada de aplicare a tratamentului cea mai eficientă este la începutul înfloritului, după ce lanul de grâu a înspicat, aproximativ 2-4 zile în funcție de soi și se întrunesc condițiile meteo.

Pentru tratament vă recomandăm:

CARAMBA 60 SL	grâu	complex boli foliare (fainarea, rugina, fuzarioza, septorioza)	1,0 l/ha	35 zil
	grâu,orz	septorioza spicelor complex boli foliare orz	1,2 l/ha	35 zil
FALCON PRO (IMPULSE PRO 425 EC)	grâu, orz, orzoaică	fuzarioza	0,8 l/ha	35 zil
	grâu, orz, orzoaică	septorioza, rugina, fainarea, patarea reticulara	0,6 l/ha	35 zil
MAGNELLO	grâu	fuzarioza, septorioza, rugina	1,0 l/ha	
MYSTIC PRO (ARES PRO)	grâu	fuzarioza	1,25 l/ha	35 zil
		boli foliare si ale spicului (fainarea, septorioza, rugina)	1,0 l/ha	35 zil
ORBIT 250 EW (MYSTIC GOLD)	grâu, orz, ovaz, secara	fuzarioza, septorioza, fainarea, rugina, patarea reticulara, arsura frunzelor de orz	1,0 l/ha	35 zil
ZANTARA 216 EC	grâu	fuzarioza	1,2 l/ha	-
	grâu, orz	fainarea, septorioza, rugina fainarea, patarea reticulara, arsura frunzelor, helminthosporium	1,0 l/ha	-

Utilizați și un insecticid, unde este cazul de atac al larvelor **Gândacului bălos sau alți dăunători**: FASTER 10 EC 100 ml/ha (cereal păioase) sau KAISO SORBIE 5 EG - 0,150 kg/ha (grâu, orz, ovăz).

Pentru tratament se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Cititi cu atentie prospectul produsului de protecția plantelor, înainte de utilizare, (atenție deosebită la faza fenologică a culturii)!

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoloalelor de colaborare nr.328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa:

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>;

<<http://www.topps-drift.org/?LANG=RO>>

În conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor și a mediul înconjurător, împotriva intoxicațiilor cu pesticide.

ȘEF SERVICIU
 Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,
 Costea Gherghina

