



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 1 / 01.02.2017

Paduchele din San – Jose , paduchele lanos ,oua de aphidae , psylidae , acarieni,
etc. – Pomi Fructiferi

Mospilan 20 SG = 0,450 kg / ha + 0,5 % **Toil** (adjuvant pe baza de ulei vegetal) – **mar , prun**
sau **Confidor Oil SC 004** = 1,5 % (22,5 L / ha) – **mar** ; 1,5 % 15 L / ha in 1000 litri apa) – **prun** sau
Nuprid Oil 004 CE = 1,5 % (22,5 L / ha in 1500 litri apa) – **mar** ; 1,5 % (15 L / ha in 1000 litri apa) –
prun ,cais , cires.

Tratamentul se va executa dupa efectuarea lucrarilor de igiena culturala ,la temperaturi de + 4 °C ;
+ 5 ° C , la pomii fara apa , chiciura sau polei .Pentru speciile pomicole semintoase tratamentul se va
efectua pana la faza de infrunzitul mugurilor – faza de urechiusa ,iar pentru speciile pomicole samburoase
tratamentul se va efectua pana la sfarsitul repausului vegetativ – faza de buton verde .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum
si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41
/ 2007 .

AVERTIZAREA NR. 2 /01.02.2017

Erwinia amylovora (Focul bacterian al rozaceelor) – MAR, PAR, GUTUI

Taierea mecanica a ramurilor cu simptome la o distanta de cel putin 50 cm sub limita prezentei
simptomelor. Intregul material vegetal se va strange si se va distruge prin ardere. Instrumentele folosite la
taiere vor fi dezinfectate dupa fiecare utilizare cu **hipoclorit de sodiu** 10 % , concentratie de 1 % .
Ulceratiile de pe trunchi vor fi extirpate inclusiv tesutul marginal de 2 cm, iar rana se dezinfecteaza.
Ranile rezultate la taiere, vor fi dezinfectate cu **1 % oxiclorigura de cupru**. Lucrarea se va executa inainte
de taierile obisnuite din livada si pana la intrarea in vegetatie a pomilor.

AVERTIZAREA NR. 3 / 01 .02.2017

TRATAMENT LA SOL – SPAȚII PROTEJATE

Basamid Granule (2) = 500,0 kg / ha - tomate sera (se administreaza la sol cu incorporare , inainte de
plantare pentru combaterea agentilor fitopatogeni de sol : Phytophthora parasitica ; Fusarium spp. ;
Verticillium dahliae , nematozi : Meloidogyne incognita) sau **Raisan 51** = 700 litri / ha - dezinfectia
solului in sere si solarii (combatere agenti patogeni : Phytophthora parasitica ; Fusarium oxysporum. ;
Verticillium dahliae , nematozi -Meloidogyne incognita si buruieni)

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum
si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 /
2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului
Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei
Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva
intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in
perioada de “ inflorire”, pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse
de protectia plantelor.

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia
plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Întocmit,
Ing. Borjoiu Liviu