



Loc. Focsani, jud.Vrancea  
Str. Milcov, nr.40  
Nr.600 din 18.04.2018

**BULETIN DE AVERTIZARE VITICULTURA**  
NR.12 DIN 18.04.2018

Condițiile climatice din ultima perioadă sunt favorabile apariției și dezvoltării următoarelor boli și dăunători: Acarieni: Erinoza (*Eriophyes vitis*) – acarianul roșu comun (*Tetranychus urticae*), acarianul galben al viței de vie (*Eotetranychus carpini*), acarioza (*Phyllocoptes vitis*) și făinarea.

Tratamentele chimice pentru combatere se fac atunci când se atinge pragul de dăunare (PED) astfel: la acarienii eriofizi (erinoza) PED-ul este de 10-25 frunze atacate iar la cei tetranychizi (acarianul roșu comun, acarioza viței de vie, produsă de *Phyllocoptes vitis* și acarianul galben al viței (*Eotetranychus carpini*) atunci când PED = 15 exemplare acarieni/lăstăraș.

Acarieni tetranichizi (Acarianul roșu, acarianul galben și acarioza)

- SAFRAN 1,8 EC – 0,8 – 1,0 litri/ha sau
- ENVIDOR 240 EC – 0,4 lt/ha sau
- NUPRID OIL 004 CE – 1,0% sau
- BELTHIRUL – 0,25-0,5 kg/ha sau

În plantațiile de viță de vie care anul trecut au fost afectate de făinare existând o rezervă biologică mare, recomandăm să se facă un tratament chimic când lăstarul are 5-7 cm înălțime, folosind fungicide specifice combaterii făinării.

- COSAVET 80 DF – 0,3% sau
- SHAVIT 25 EC -0,02% sau
- MICROTHIOL SPECIAL – 0,3% sau
- DOMARK 10 EC – 0,025%.

Se pot utiliza și fungicide de contact care nu au în componență sulf ca substanță activă cum ar VIVANDO – 0,02%; KARATHANE GOLD 350 EC- 0,5 litri/ha, (care acționează eficient și la temperaturi mai scăzute).

Se pot folosi cu rezultate bune și tratamente cu fungicide pe bază de sulf pulbere, SULFOMAT 93 P – 20 kg/ha.

Eriophyes vitis – Erinoza viței de vie  
- VERMITEC PRO – 0,75 litri/ha

**ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:** Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANȚEI prin care se înțelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite și au mecanisme de acțiune complet diferite.

La realizarea amestecurilor verificați compatibilitatea pesticidelor (fizică și chimică). Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de pază și securitate a incendiilor, DE PROTECȚIE A ALBINELOR (conform Ordinului interministerial nr.127/1991), animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

**CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :**

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate ;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațiile agricole ;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor .