



Loc. Focsani, jud. Vrancea
Str. Milcov, nr.40
Nr. din 25.04.2018

BULETIN DE AVERTIZARE POMICULTURĂ MĂR +PĂR+GUTUI
nr.13 din 25.04.2018



1.Monilioza 2.Anthonomus pomorum 3.Sciaphobus squalidus ,4-5.Rapanul

În aceasta perioada se combat următorii agenți de dăunare în plantațiile de măr ,păr și gutui:

- Gărgărița florilor de măr – Anthonomus pomorum
- Gărgărița mugurilor – Sciaphobus squalidus
- Rapăn, făinare, monilioze.

Perioada optimă la începutul căderii petalelor ce marchează sfârșitul înfloririi.

Redăm mai jos o schemă orientativă de tratament:

Fungicide ce combat rapănul și făinarea:

FLINT PLUS 64 WG- 1,875 kg/ha sau
FOLICUR SOLO 250 EW-0,04% sau
CLARINET 0,1% sau
DOMARC 10 EC – 0,027%

Fungicide ce combat rapănul și monilioza:

DITHANE M 45 -0.2% sau
VONDOZEB -0.2% sau
DITHANE NEOTEC 75 WG-0,2%

Insecticide recomandate pentru combaterea dăunătorilor:

CALYPSO 480 SC-0,02% ,în plantațiile infestate cu purici meliferi și păduche lănos se adauga MOVENTO 1,875 l/ha sau POLECI - 0,03% - 0.05%.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE: Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANȚEI prin care se înțelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite și au mecanisme de acțiune complet diferite.

La realizarea amestecurilor verificați compatibilitatea pesticidelor (fizică și chimică). Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de pază și securitate a incendiilor, DE PROTECȚIE A ALBINELOR (conform Ordinului interministerial nr.127/1991), animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate ;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațiile agricole ;
- să păstreze o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor .

Întocmit ,
Ing. Șerban Valentina