



BULETIN DE AVERTIZARE NR 14/359/04.05.2017

TRATAMENT PENTRU COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR LA SPECII SAMBUROASE
PRUN

Viespea semintelor de prun(Eurytoma schreineri)

Daunatorul ierneaza ca larva complet dezvoltata in samburii fructelor atacate si dezvoltata o singura generatie pe an.Zborul maxim al adultilor coincide fenologic,de regula,cu desprinderea caliciului.Femela depune oul in samburele crud al fructelor verzi ,abia legate .Intr-un fruct este depus un singur ou,iar prolificitatea unei femele ajunge pana la 120 oua.La inceput prunele infestate nu se pot distinge de cele sanatoase ,diferentierea facandu-se mai tarziu ,cand fructele incep sa cada din pom.Fructele raman mai mici fata de cele sanatoase ,au aspect clorotic cu tenta violacee,o usoara asimetrie si un inceput de vestejire .In anii cu infestari masive, frecventa fructelor atacate ajunge pana la 90% .



Produse recomandate:

LASSER 240SC-0,06%(insecticid biologic ,actioneaza prin contact si ingestie;are eficacitate de durata) *sau*
NURELLE D 50 /500 EC-0,08%(insecticid cu spectru larg de actiune combate adultii si stadiile larvare in livezi ,**toxic pentru albine**) *sau*

MOVENTO 100SC-1,875l/ha (insecticid care prezinta caracteristica unica a unei sistemacitati totale ascendente si descendente precum si perioada lunga de protectie)

Momentul aplicarii tratamentului: tratamentul se aplica la **7-10 zile** de la caderea petalelor,in momentul desprinderii caliciului de pe fructele abia formate.

Pentru combaterea moniliozei se va adauga: CHORUS 50 WG-0,45kg/ha sau TELDOR 500SC-0,08%

CIRES,VISIN

Pentru combaterea moniliozei si a patarilor de frunze se va aplica:

TOPAS 100 SC-0,05% (produs omologat pentru patarea frunzelor si monilioza) *sau*
TELDOR 500 SC-0,08%(pentru prevenirea si combaterea moniliozei)

PIERSIC

Pentru combaterea moniliozei si basicarii frunzelor:

CHORUS 50WG-0,45kg/ha (pentru combaterea moniliozei) + **BRAVO500SC-0,15%**(pentru combaterea basicarii frunzelor) *sau*

SCORE 250 SC-0,02%(pentru combaterea moniliozei,basicarii si fainarii)

Alte recomandari:

- Este indicat a se utiliza un ingrasamant foliar care accelereaza cresterea si dezvoltarea si care mareste rezistența la boli si la factorii de stres(**Cropmax sau Atonik,FoliMAX BorON Plus sau Terra-Sorb Complex** sau alt ingrasamant foliar care sa contina macro si microelemente

- Pentru protectia albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind masurile pentru protectia familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu pesticide Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei; 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania, Legea apiculturii 383 /2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.205 încheiat între Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România - Romapis , privind implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

- Producatorii agricoli sunt obligati sa întocmeasca **Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor** (conform modelului transmis). Conform **Regulamentului (CE) nr.1107/2009 , art.67**, utilizatorii profesioniști de produse de protectia plantelor au obligatia sa păstreze pe o perioada de cel puțin 3 ani evidenta produselor de protectia plantelor pe care le utilizează.

- Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plati în cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizarea produselor de protectia plantelor (**SMR 10**)

- Respectati cu strictete conditiile de depozitare,de manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor în exploatarele agricole,asa cum sunt prevazute în Ghidul pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>)

- Respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor si pe cele de securitate si protectia muncii.

- Cititi cu atentie si respectati masurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizati.

Intocmit,ing.Ciobanu Maria