



Str. Republicii .nr 5
Loc.Focsani., Jud. Vrancea.

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”

B.A. Nr. 16 din 11/04/ 2017

BULETIN DE AVERTIZARE PRUN

TRATAMENTUL I-Agenții patogeni:Monilioze(*Monilinia laxa* în special, cât și *Monilinia fructigena*), Ciuruirea frunzelor de prun(*Coryneum beijerinckii*), Pătarea și ciuruirea bacteriană a sămburoaselor (*Xanthomonas pruni*,*Pseudomonas mors prunorum*), Rapăn prun(*Venturia c sinonim Fusicladium pruni*).**Perioada optimă de tratament:., Buton alb”**.Prin acest tratament se combat și se diminuează formele de rezistență peste iarnă a bolilor(miceliu de rezistentă, ascospori, conidii de iarnă) reducându-se astfel infecția primară.

FUNGICIDE FOLOSITE: unul din produsele

-**BOUILLE BORDELAISE WDG-0,5%**(s.a.-Cu sub forma de sulfat de cupru neutralizat-20%)

Pătarea roșie, ciuruire, monilioza sămburoaselor

-**ALCUPRAL 50 PU-0,2%**-(s.a.-Cu sub forma oxicolorură de cupru-50%)

Pătarea roșie, ciuruire, monilioza sămburoaselor

-**ROVRAL 500 SC-0,1%**-(s.a.-iprodin-500 g/l)-monilioza fructelor, monilioza sămburoaselor

-**FOLPAN 80 WDG-0,2%**-(s.a.-folpet-80%)-pătarea roșie, ciuruirea frunzelor

TRATAMENTUL II-Agenții patogeni:Moniliaze(*Monilinia laxa si fructigena*),Deformarea fructelor (*Taphrina deformans*),Ciuruirea micotică(*Ascospora beijerinckii*),Pătarea roșie a frunzelor(*Polystigma rubrum*),Viespea prunelor: *Hoplocampa minuta* (Viespea neagră) *si Hoplocampa flava*(Viespea galbenă),forme de rezistență peste iarnă: acarieni, insecte defoliatoare, afide.

Perioada optimă: la scuturarea petalelor(când 10-15% din petale s-au scuturat)

Schema orientativă de tratament:

FUNGICIDE: unul din produsele

-**BRAVO 500 SC-0,15%**(s.a.-clorotalonil-500 g/l)-pătarea roșie, monilioza samburoaselor;

-**CAPTAN 80 WDG-0,15%**(s.a.-captan 80%)-pătarea roșie, monilioza sămburoaselor;

-**MERPAN 50 WP-0,2-0,25%** (s.a.-captan 50%)-pătarea roșie, monilioza fructelor,ciuruirea frunzelor;

-**VONDOZEB-0,2%**(s.a.-mancozeb-80%)-pătarea roșie, monilioza sămburoaselor

+

INSECTICIDE: unul din produsele

-**KARATE ZEON- 0,015%**(s.a.-lambda-cihalotrin-50 g/l)-viermele prunelor, viespea sămburilor de prun,viespea neagră a prunelor;

-**LASER 240 SC-0,06%**(s.a.-spinosad-240 g/l)-viermele prunelor,viespea sămburilor de prun;

-**CALYPSO 480 SC-0,02%**(s.a.-tiacloprid 480 g/l)-viermele prunelor,viespea sămburilor de prun, viespea neagră a prunului, păduchele cenușiu al prunului

ACARICIDE: unul din produsele

-**VERTIMEC 1,8% EC-0,1-0,15%**(s.a.-abamectin-18 g/l)-acarianul roșu al pomilor, acarianul roșu comun, acarianul filicopid al măruului

-**NISSORUN 10 WP-0,03%**(s.a.-hexithiazox-10%)- paianjenul roșu al pomilor

-**APOLLO 50 SC-0,04%**(s.a.-clofentezinn-500 g/l)-paianjenul roșu al pomilor

Cantitatea de soluție la hectar-1000-1500 litri.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim neuitand cugetarea că,**neefectuarea unui tratament la timp,anuleaza efectul celorlalte anterioare.**”Se vor respecta dozele sau concentrațiile recomandate în instrucțiunile de folosire, se va respecta principiul alternanței

Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitatea muncii, de **PROTECTIE A ALBINELOR**(Conf.Leg.383/2013), animalelor, peștilor și a altor viețuitoare acvatice.

Intocmit,
Ing.Călțun Florin



Str .Republicii .nr 5

Loc.Focsani., Jud. Vrancea.

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”

B.A. Nr. din 2016

**BULETIN DE AVERTIZARE
TRATAMENTE DE IARNA LA VITA DE VIE**

Lupta impotriva agentilor de daunare in aceasta perioada se face in functie de atacul din anul precedent,prezenta soiurilor sensibile si conditiile climatice din anul in curs.In anul precedent,unde s-a constatat prezenta masiva a atacului agentilor de daunare, in vederea limitarii riscului si a raspandirii atacului se vor lua unele masuri dupa cum urmeaza:

1.ACARIENII ERIOFIZI-speciile:Calepitrimerus vitis si Colomerus vitis

Eriofizii ierneaza ca femela adulta in colonii in mugurii de la baza lastarilor sau sub scoarta.

In functie de nivelul atacului din anul precedent(rezerva biologica),se va marca zonele de atac,in scopul aplicarii tratamentelor in fenofazele sensibile la atac.Prezenta frunzelor intepate si bronzate la sfarsitul verii este un indicator important in cea ce priveste rezerva de acarieni.In perioada de **pre-dezmugurit**, prin observatii microscopice asupra mugurilor de iarna,cand se depaseste PED=5-6 acarien/mugure se recomanda tratamente fitosanitare cu unul din produsele:

CONFIDOR OIL SC 004-1,5%

Intocmit,
Ing.Caltun Florin

