



BULETIN DE AVERTIZARE Nr.20/O/26.05.2017

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii: **viermele cireșelor (*Rhagoletis cerasi* L.)**, afide (*Myzus cerasi*), insecte defoliatoare, acarieni, monilioza (*Monilinia* spp.), ciuruire micotică și bacteriană, antracnoza (*Blumeriella jaapi*), precum și alți agenți de dăunare care pot cauza pierderi importante în plantațiile de cireș și vișin.

Insecta *Rhagoletis cerasi* L, este răspândită în toate livezile cu soiuri de cireș și vișin cu coacere târzie și foarte târzie, iar în condiții de climă favorabile, poate produce pagube însemnate, diminuând semnificativ recolta.

Pentru prevenire și combatere se vor efectua două tratamente fitosanitare utilizând următoarele combinații de produse astfel:

1. CALYPSO 480 SC 0,02% + SIGNUM 500 SC 0,05% sau SWITCH 62,5 WG 1,0 kg/ha ;
2. VANTEX 60 CS 0,07% sau FASTAC 10 EC 0,02% + ORIUS 25 EW 0,075-0,1% sau TELDOR 500 SC 0,08%;
3. EFORIA 45 ZC 1,3-1,5 l/ha sau KARATE ZEON 0,015%+ MERPAN 50 WP 0,25% sau ROVRAL 500 SC 0,1%;
4. DECIS MEGA 50 EW 0,015%+ TOPAS 100 EC 0,05% sau TOPSIN 70 WDG 0,07%.

Perioada optimă de tratament

T₁ – 29.05- 03.06.2017;

T₂ - se va aplica la un interval de 6-8 zile de la cel anterior.

NOTĂ:

a) **Se va respecta timpul de pauză până la recoltare de 7 zile** în cazul fungicidelor: SIGNUM 500 SC, SWITCH 62,5 WG, SCORE 250 EC, ROVRAL 500 SC, TELDOR 500 SC și a insecticidelor: LASER 240 EC, KARATE ZEON, DECIS MEGA 50 EW, FASTAC 10 EC- b).

b) **Se va respecta timpul de pauză până la recoltare de 15 zile** în cazul produselor de protecția plantelor cu acțiune fungicidă: ORIUS 25 EW, TOPAS 100 EC, MERPAN 50 WP, TOPSIN 70 WDG și a produselor cu acțiune insecticidă (CALYPSO 480 SC 0,02%, NOVADIM PROGRESS, VANTEX 60 CS, EFORIA 45 ZC).

ATENȚIE! Tratamentele se aplică numai la soiurile cu coacere târzie și foarte târzie (Germersdorf, Boabe de Cotnari, Hedelffinger etc.).

ATENȚIE! La toate variantele de rețete atât la cireș cât și la vișin, se va adăuga și un îngrășământ foliar (în special pe bază de calciu) pentru a preveni și elimina bolile fiziologice și deprecierea recoltei.

Alte recomandări: Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru (ploi, temperaturi scăzute), tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

- Tratamentele se vor aplica la temperaturi sub 20°C;

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate pentru testele avertizate care se regăsesc în lista oficială PEST EXPERT.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Departamentului Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015 încheiat între **Agencia Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România**, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/ 2009; HG nr. 1559/2012; OG. Nr. 4/ 1995; OG nr.41/ 2007; HG 1230/2012 și Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 încheiat între APIA și ANF, agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

-Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație, precum și Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare;

Fiecare utilizator de produse de protecția plantelor trebuie să dețină și să completeze la zi registrul de evidență tratamentelor fitosanitare, după efectuarea fiecărui tratament.

-Acest registru trebuie păstrat la domiciliul fermierului sau la sediul exploatației o perioadă de cel puțin 3 ani.

-Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA și inspectorii Oficiului Fitosanitar Județean.

-Nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a acestor prevederi, se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

ANEXA 2 la Buletinul de avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societății (Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

În conformitate cu HG 1230/2012, Art.3(1), lit. i), constituie contravenție nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care

Întocmit,

Dr.ing. Melania OLTEAN

