



BULETIN DE AVERTIZARE NR 21/334/10.05.2018

TRATAMENT PENTRU COMBATEREA BOLLOR SI DAUNATORILOR LA SPECII SEMINTOASE

DAUNATORI

VIERMELE MERELOR (Carpocapsa pomonella) - generatia I-a



În stadiul de larvă într-un cocon mătășos, în crăpăturile scoartei pomilor, în depozitele de păstrare a fructelor. Dezvoltă frecvent două generații pe an. Primii fluturi apar în luna mai iar zborul lor este crepuscular și nocturn și se înregistrează când temperatura aerului depășește 15°C. Ouăle sunt depuse izolat sau în grupe mici de 2-3 ouă pe frunze, fructe sau lăstari. Perioada de incubare durează 6-13 zile, după care apar larvele care dăunează fructele tinere, de mărimea unei alune; roșd galerii în pulpa fructelor, consumă semințele, trecând dintr-un fruct în altul. Până la completă dezvoltare o larvă ataca 2-3 fructe vecine.

PRODUSE RECOMANDATE /DOZA :

CORAGEN - 0,01% s.a. clorantraniliprol, insecticid cu acțiune sistemică locală și translaminară, acționează rapid asupra ouălor, larvelor și adulților ; omologat și pentru combaterea molii miniere sau

AFFIRM OPTI- 2,5 kg/ha- s.a. emamectin benzoate, insecticid care acționează prin contact și ingestie ; omologat și pentru combaterea moliei pielitei, molii miniere sau

NOVADIM PROGRES-0,1%-insecticid organofosforic sistemic ,cu spectru larg de acțiune, omologat și pentru combaterea afidelor, paduchelui roz, paianjenului roșu

BOLI

Pentru prevenirea și combaterea rapănului la măr și par, a făinării la măr precum și pentru prevenirea bolilor la gutui (patarea brună a frunzelor, mumifierea fructelor) se va utiliza unul din următoarele fungicide:

SYSTHANE FORTE – 0,02 % -(s.a. miclobutanil) fungicid sistemic, cu rol preventiv, curativ și eradicativ, protejând și organele nou formate între două aplicări

SERCADIS-0,25-0,3l/ha, fungicid sistemic, asigură o combatere excelentă a rapănului și făinării sau

FOLICUR SOLO 250 EW-0,05% sau MYSTIC EXTRA -0,05% (s.a. tebuconazol), produse sistemice, acționează preventiv, curativ și în unele situații eradicativ;

În plantațiile de măr în care există atac de făinare se va aplica suplimentar (separat) unul din următoarele produse **CYFLAMID 5EW-0,45l/ha sau TOPAS 100EC-0,02% sau BUMPER 250EC-0,03%**

MOMENTUL APLICĂRII TRATAMENTULUI

Tratamentul se va aplica în perioada 11-14.05.2018

Alte recomandări

- Pentru protecția albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind măsurile pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației; 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea apiculturii 383 /2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.205 încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și

Asociația Crescătorilor de Albine din România, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România - Romapis , privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

- Este interzis pasunatul în zonele tratate !
 - La efectuarea tratamentelor se vor utiliza numai produse de protecția plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor și înregistrate în baza de date Pest-Expert, și numai de la distribuitorii / comercianții înregistrați pentru comercializarea acestora. La primirea ofertelor de la distribuitorii de inputuri, producătorii agricoli trebuie să le solicite acestora certificatul de înregistrare pentru comercializarea ppp. și documentele care însoțesc produsele (declarația de conformitate, buletinul de analiză, fișa tehnică de securitate, facturi, avize).
 - Producătorii agricoli sunt obligați să întocmească **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor** (conform modelului transmis). Conform **Regulamentului (CE) nr.1107/2009 , art.67**, utilizatorii profesioniști de produse de protecția plantelor au obligația să păstreze pe o perioadă de cel puțin 3 ani evidența produselor de protecția plantelor pe care le utilizează. **În conformitate cu HG 1230/2012, Art.3(1), lit. i), constituie contravenție nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează și se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei.**
 - Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizarea produselor de protecția plantelor (**SMR 10**)
 - Respectați cu stricte condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>). Este obligatorie returnarea ambalajelor goale, după tripla clătire, către furnizorii de pesticide, care au obligația de a le primi, prin programul gratuit SCAPA sau în condițiile stabilite cu furnizorii.
 - Respectați măsurile cu privire la utilizarea produselor de protecția plantelor, așa cum au fost prezentate în buletinele de avertizare anterioare.
 - Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.
- Intocmit, ing. Ciobanu Maria