



Str .Republicii....nr 5
Loc.Focsani Jud. Vrancea

Telefon:0237/239074

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”

B.A.-Nr. 44 din 08.06.2017

BULETIN DE AVERTIZARE LEGUMICULTURĂ – BOLI ȘI DĂUNATORI LA SOLANACEE

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția unor boli:

Pătarea brună a frunzelor(*Alternaria porii*), **Pătarea albă**(*Septoria lycopersici*), **Pătarea cafenie** (*Cladosporium fulvum*), **Antracnoza**(*Colletotrichum coccodes*), **Mana**(*Phytophthora infestans*) la **TOMATE, ARDEI, VINETE**. Pentru combaterea acestor agenți de dăunare recomandăm folosirea următoarelor produse de protecția plantelor:

FUNGICIDE DE CONTACT:

- BRAVO 500 SC-0,2%**(s.a.-clorotalonil-500 g/l) sau
- MERPAN 50 WP-0,2%**(s.a.-captan-50%)-mana, patarea alba
- **0,25%**(s.a.-captan- 50%)-patarea cafenie
- POLYRAM DF-0,2%**(s.a.-metiram-80%) sau
- BOUILLE BORDELAISE WDG-0,75%**(s.a.-cupru sub forma de sulfat de cupru neutralizat) sau
- DITHANE NEOTEC 75 WG-0,25%**(s.a.-mancozeb-75%)-mana
-**0,2%**(s.a.-mancozeb-75%)-patarea cafenie, patarea alba, patarea frunzelor și
basicarea fructelor, cancerul bacterian, antracnoza

FUNGICIDE SISTEMICE:

- CABRIO TOP-0,15-0,2%**(s.a.-metiram 500%+piraclostrobin 5%) sau
- FOLIO GOLD 537,5 SC-0,2%** (s.a.-clorotalonil 500 g/l+metalaxil-M 37,5 g/l) sau
- MELODY COMPACT 49 WG-0,2%**(s.a.-cupru sub forma de ox.de cupru 40,6%+iprovalicarb 5,50%)

În cazul când sunt precipitații abundente de peste 18-20 mm., temperaturi ridicate, umiditate atmosferică >90%, prezenta picăturilor de apă ce persista pe frunza cel puțin 10-12 ore, recomandăm efectuarea tratamentelor folosind **FUNGICIDE SISTEMICE**.

Pentru combaterea daunatorilor cum ar fi:

Musculița albă de seră, Paduchele solanaceelor, Păduchele verde, Omida capsulelor de bumbac, Musca miniera, Tripsi, în soluția de stropit se adaugă și un insecticid :

- MOSPILAN 20 SP-0,04%**(s.a.-acetamiprid-20%)-tripsi calif.
-0,025%(s.a.-acetamiprid-20%)-musculița albă de seră
- ACTARA 25 WG-0,02%**(s.a.-tiametoxam-25%)-musca miniera, musculița albă de seră, tripsi
- NUPRID 200 SC-0,04%**(s.a.-imidacloprid-200 g/l)-paduchele solanaceelor
-0,075%(s.a.-imidacloprid-200 g/l)-musculița albă de seră, tripsul tutunului
- MAVRIK 2F-0,05%**(s.a.-tau-fluvalinat-240 g/l)-omida fructificațiilor, musculița albă de seră
- CONFIDOR ENERGY-0,08%**(s.a.-imidacloprid 75g/l+deltametrin 10g/l)-omida fructificațiilor
-0,13%(s.a.-/-/-/-/-)-tripsul tutunului, musca miniera

Pentru combaterea **ACARIENILOR** recomandăm unul din acaricide:

- VERTIMEC 1,8 EC-0,1%**(s.a.-abamectin 18 g/l)-acarianul lat, ardei
- ORTUS 5 SC-0,1%**(s.a.-fenpiroximat 50g/l)-acarianul roșu

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim respectându-se dozele sau concentrațiile recomandate în instrucțiunile de folosire. La efectuarea tratamentelor cu P.P.P., se vor respecta cu strictete normele de protecția muncii, de protecție a mediului, **ALBINELOR**(Conf.Leg.383/2013)

Intocmit,
Ing.Călțun Forin

