



Str .Republicii .nr 5
Loc.Focsani., Jud. Vrancea.

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”

B.A. Nr. 63 din 27.oct .2016

BULETIN DE AVERTIZARE RAPITA DE TOAMNA

In urma controlului fitosanitar la cultura de rapita s-a depistat atac de **VIESPEA RAPITEI** (*Athalia rosae*) care este cel mai periculos daunator de toamna a culturii de rapita. Insecta poate avea 2-3 generatii pe an (**generatia a II-a atacand in toamna culturile de rapita**). Larvele sunt deosebit de daunatoare, deoarece ataca tesutul frunzei, formand galerii, apoi consuma limbul pana la scheletare. Ele sunt foarte vorace, consumand in 24 ore dublu greutatea lor. Atacul din toamna este foarte periculos putand duce la defolierea totala a culturii.

COMBATERE:

- FASTAC ACTIVE-0,15-0,2 l/Ha**-(s.a.-alfa-cipermetrin-50 g/l) sau
- FASTER 10 EC-0,2%** (s.a.-cipermetrin-100 g/l) sau
- NUPRID AL 200 SC-0,275 l/Ha** (s.a.-imidacloprid-200g/l) sau
- MAVRIK 2 F -0,2 l/Ha** (s.a.-tau-fluvalinat-240 g/l)

Cantitatea de solutie la hectar 250-300 litri.

ATENTIE:

Verificarea culturilor de rapita de toamna unde nu s-a respectat asolamentul si rotatia culturilor, unde au fost prezente buruieni din familia crucifere.

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim cu respectarea dozelor sau concentratiilor recomandate. Se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii, de securitate impotriva incendiilor, de protectie a mediului, ALBINELOR (Conf. Leg. 383/2013).

Intocmit,
Ing. Caltun Florin

