



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
**AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ**  
 OFICIUL FITOSANITAR OLT

Str. Arcului Nr. 20  
 Loc. Slatina, Jud. Olt

Telefon: 0249436234  
 Fax: 0249415360  
 Slatina,  
 Nr. 830 /O/16.06.2017

**Stimată Doamnă / Stimate domnule primar**

**Ref.: : Recomandări privind combaterea agenților de dăunare la cultura de PEPENI VERZI (CITRULLUS VULGARIS).**

Pepeni verzi cultivați în câmp prin semănat direct cât și prin răsad produs în spații protejate sunt afectați de o serie de agenți de dăunare , care evoluează optim în condiții de umiditate și temperaturi ridicate(pepenele verde fiind o plantă termofilă). Atacul agenților de dăunare pot compromite întreaga cultură. Pentru obținerea de producții sănătoase și de calitate, efectuarea tratamentelor fitosanitare la timp , va aduce beneficii maxime și sigure pentru fermieri.

Tratamentele fitosanitare de combatere a agenților de dăunare în cultura de pepeni verzi se va face cu unul din produsele de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor :

TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE					
NR. CRT.	DENUMIREA PRODUSULUI DE PROTECȚIE A PĂLANTELOR	AGENTUL DE DAUNARE		DOZA UTILIZATĂ	PERIOADA DE APLICARE
		BOLI	DĂUNĂTORI		
1.	CIDELY TOP	- erysiphe spp., podosphaera x (făinarea) - colletotrichum l. (antracnoza) - alternaria c. (alternarioza) -dydimella b. (putregaiul tulpinilor) -cladosporium c.(patarea bruna)	-	1,0 l/ha	de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor
2.	ORTIVA TOP	-sphaerotheca f; erysiphe c. .(făinarea) -cladosporium c.(patarea bruna)	-	1,0 l/ha	
3.	ACROBAT MZ 69 WG	-pseudoperonospora c. (mana)	-	2 ,0 kg/ha	
4.	SHAVIT F 72 WDG	-alternaria c. (alternarioza)	-	0,2%	
5.	REFLECT	-spaerotheca f.,erysiphe c.(fainarea)	-	1,0 l/ha	aparitia primei flori pe tulpina principala pana la coacerea deplina a fructelor.
6.	ANTRACOL 70 WG	-pseudoperonospora c. (mana) -colletotrichum l. (antracnoza)	-	3,0 kg/ha (0,3 %)	
7.	TOPAS 100 EC	-spaerotheca f.,erysiphe c. (fainare)	-	0,5 l/ha	se aplica 3 tratamente
8.	TOPSIN 500 SC	- colletotrichum l. (antracnoza)	-	0,07 % (0,7 l/ha in 1000 l apa)	se aplica de la a 9-a floare de pe tulpina desfacuta pana la maturarea completa
		-fusarium o.(fuzarioza)	-	0,07 – 0,14 % (0,5 l solutie/planta)	
9.	VERTIMEC PRO	-	-tetranychus sp. (păianjeni) -frankliniella spp (tripsi) -liriomyza spp.(muste) -eriphyes sp(acarieni)	1,2 l/ha	
10.	VERTIMEC 1,8 EC	-	-tetranychus sp. (păianjeni) -frankliniella spp (tripsi) -liriomyza spp.(muste) -eriphyes sp(acarieni)	0,75 – 1,2 l/ha	

11.	INVERT 1,8 EW	-	-tetranychus u. (păianjenul roșu) -panonychus spp. (acarieni)	0,15-1,0 l/ha in 750-1000l apa	se aplica la aparitia formelor mobile
12.	NISSORUN 10 WP	-	-tetranychus u. (păianjenul roșu) -panonychus spp. (acarieni)	0,8 kg/ha	
13.	MATCH 050 EC	-	frankliniella spp(tripsi)	0,2 % (200ml/ hl)	se aplica la infestare,de la a 3- a frunza adevarata pana la intrarea in parga a fructelor
			helicoverta a.(omida fructelor)	0,1 % (100 ml/hl)	

Se vor respecta cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor.

Se va respecta Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

**Se va respecta cu strictete timpul de pauza (perioada de la aplicarea tratamentului - pana la recoltare) mentionat pe eticheta produsului si aprobata de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.**

Vă recomandăm „Ghidul de utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor“ aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, pentru o mai bună informare a dumneavoastră.

COORDONATOR  
OFICIUL FITOSANITAR OLT,  
**Marian Emi BUZATU**

INTOCMIT,  
**Sima SIMONA**

**Doamnei / Domnului primar**

**Primăria - TOATE**

