



Sibiu  
Nr. 464 /O/25 .04.2017

## INFORMARE

### TÂNȚARUL FRUNZELOR DE BUXUS – *Monarthopalpus buxi* (Kieff.)



**Planta gazdă:** - Buxus (*Buxus serpenvirens*)

**Organe atacate:** - aparat foliar;

**Forma de manifestare:** Frunze gofrate de culoare galben – ruginiu în contrast cu verde brumăriu care reprezintă culoarea lor normală.



Atacul este produs de larvele (miniere) dăunătorului care distrug țesuturile dintre epiderme;

La atac puternic poate cauza uscarea ramurilor și căderea aparatului foliar.

**Descriere:** Adult galben-portocaliu, de 3-4 mm lungime. Larvele sunt de culoare portocalie, de 3 - 4 mm lungime;

- Iernează în stadiul de larvă în țesuturile frunzelor, loc unde în luna aprilie are loc împuparea;

- Adulții apar spre sfârșitul lunii aprilie – începutul lunii mai;

- Ouăle sunt depuse în țesuturile frunzelor.

**Măsuri de prevenire și combatere:**

- Eliminarea ramurilor cu simptome de atac și arderea acestora.

- Pentru combaterea chimică a dăunătorului, nu sunt produse de protecție a plantelor omologate.



COORDONATOR OFICIUL FITOSANITAR  
Elena STANCU

ÎNTOCMIT  
Cons. sup. Ana TIMA