

OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80Tel/ Fax:0265.435245
ofmures@anf.ro**BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 14/ 20.04. 2022**

În perioada următoare se recomandă aplicarea unor tratamente chimice la speciile sămburoase pentru prevenirea și combaterea mai multor boli și dăunători, după cum urmează:

A. La cireș - vișin

Tratamentul III se aplică la începutul înfloritului până la deschiderea a 50 – 60% din flori (pentru combaterea moniliozei, antracnozei, ciuruirilor și altor agenți patogeni). Vă recomandăm unul din următoarele produse: PROLECTUS – 0,8 – 1,2 kg/ha sau SIGNUM (SYREX STAR) 0,5 kg/ha sau SWITCH 62.5 WG - 0,1 kg/ha sau ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW) – 0,075–0,1% (0,075–1,0 l/ha în 1000 litri apă) sau alt produs omologat cu efect similar.

Dacă în timpul înfloritului plouă și este rece mai multe zile la rând se impune aplicarea unui tratament folosind unul din fungicidele recomandate la faza de început al înfloritului folosite împotriva moniliozei și antracnozei.

Tratamentul IV – la începutul scuturării petalelor (peste 20% petale scuturate) contra moniliozei, antracnozei, ciuruirii frunzelor, bacteriozelor, insecte defoliatoare, minatoare, afide, etc. recomandăm FOLICUR SOLO 250EW (VALOR 250 EW)–0,75 l/ha sau SCORE 250EC (MAVITA 250 EC)–0,2 l/ha, sau ORIUS 25EW (SALVATOR 25EW)–0,075- 0,1% + MAVRIC 2F (EVURE)– 0,05%.

B. La prun – tratamentul III se va aplica în faza căderii petalelor pentru combaterea viespii semințelor, afidelor, defoliatorilor, moniliozei, pătării roșii a frunzelor, ciuruirii, etc. Pentru acest tratament recomandăm:

MAVRIC 2F (EVURE) – 0,05% + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha (0,05%)



Tratamentul se aplică când se realizează 10-12 °C și plantele au 2-3 frunze.

ATENȚIE!

Pentru tratamentele recomandate se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Norma de soluție pentru prun cais, piersic este de 1000 litri soluție /ha iar la cireș și vișin este de 1500 litri soluție /ha.

În cazul produselor pentru protecția plantelor complexate se va efectua în prealabil testul de compatibilitate.

Respectați cu strictețe indicațiile din prospectul fiecărui produs folosit. Tratamentele se vor efectua pe timp liniștit, fără vânt.

Folosiți numai produse pentru protecția plantelor care prezintă selectivitate pentru entomofauna utilă, în perioada de înflorire a pomilor și se vor avertiza apicultorii din zona în care urmează a fi tratate suprafețele.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp se vor respecta prevederile legale, respective Ordinul comun nr. 45/ 1991 al MAA 178/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 15b/3404/1991, al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al ACA din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii precum și a Protocoalelor de colaborare nr. 328432/ 31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016, încheiate între ANF, ACA și FAA din România.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare.


Se vor utiliza numai ppp omologate, înregistrate în baza de date PEST-EXPERT accesată la adresa: <https://aloe.anfdf.ro/>

Respectarea prevederilor legale privind utilizarea ppp este verificată prin controale în teren de inspectorii OF și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa:

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> În conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător!

SEF SERVICIU
Dr. ing. Pogăcian Marian



Intocmit
Ing. Bologa Vasile