



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Vrancea
Str. Milcov, Nr.40, Focșani,
Jud. Vrancea

Telefon/fax 0237210164
E-mail: ofvrancea@anf.ro
Nr. 897 din 05.05.2022

BULETIN AVERTIZARE NR 16

Condițiile climatice sunt favorabile dezvoltarea dăunătorului la LUCERNĂ gărgărița (HYPERA VARIABILIS) Gărgărița are o generație pe an, apare în prima decadă a lunii mai. Adultii rod frunzele, larvele sunt miniere și prin hrănire atacă vârful de creștere. La atac puternic cultura are aspect de arsură.

Pentru combatere recomandăm următoarele produse de protecție a plantelor:

- KARATE ZEON 0,15 l / ha pentru lucerna sămânță sau,
- FASTER 10 CE -0,1 l/ha sau,
- DELMUR -500m l/ha.

Puteți utiliza și alte produse de protecția plantelor cuprinse în baza de date PEST – EXPERT de pe site-ul M.A.D.R. (www.madr.ro). Important: folosirea adjuvanților la oricare tratament cu produse ppp de contact sau sisteme efectuate, permite acoperirea rapidă a suprafețelor tratate și influențează pozitiv alipirea soluției pe plante, asigură rezistența la spălarea de către ploii, contribuind în acest fel la creșterea considerabilă a eficacității tratamentelor fitosanitare.

Alte recomandări:

- tratamentele fitosanitare se vor efectua pe vreme liniștită sau la viteze ale vântului cuprinse între 0,5-3 m/sec. La viteze ale vântului mai mari de 3 m/sec. nu se vor efectua tratamente fitosanitare.
- citiți cu atenție toate instrucțiunile de pe eticheta produsului;
- utilizați responsabil toate produsele fitosanitare;
- nu tratați lângă cursurile de apă, santuri și alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- folosiți numai aparate de stropit în stare perfectă de funcționare, bine reglate și calibrate;
- clătiți de trei ori ambalajele în care au fost ppp și turnați apa de clătire în cuva;
- aplicați pe parcele tratate restul de soluție din cuva, diluată cu apa de clătire;
- spălați aparatele de stropit după fiecare tratament;
- nu deversați apele reziduale lângă cursurile de apă, locuințe.

ATENȚIE!!!!

Având în vedere că sezonul apicol se află în plină activitate, se impune necesitatea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Respectați cu strictețe perioadele de remanență a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr.3242/F/21.10.2016 dintre MADR-ANF și ROMAPIS, Ordinul comun Nr.45/1991/127/68/15B/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociația Crescătorilor de Albine din ROMÂNIA, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Pentru prevenirea intoxicațiilor la albine, deținătorii de suprafețe agricole și silvice (fermieri/producători agricoli) sunt obligați să anunțe în scris consiliile locale / primăriile cu cel puțin 48 ore înainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prăfuire, stropire, aerosoli). Consiliile locale, precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunțe în scris sau telefonic apicultorii care au vatră sau stupină staționară/permanent sau temporară / pastorală cu cel puțin 24 ore înainte de efectuarea de către deținătorii de suprafețe agricole sau silvice (fermieri / producători agricoli), a tratamentelor cu ppp, în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine.



Șef serviciu,
Ing.
Neață Împăratu Ioana

Întocmit
Ing. Șerban Valentina

4



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Vrancea

Str. Milcov, Nr.40, Focșani,

Jud. Vrancea

Telefon/fax 0237210164

E-mail: ofvrancea@anf.ro

Nr. 898 din 05.05.2022

BULETIN AVERTIZARE NR.17

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului la cereale de toamnă
:Gândacul bălos (Lema melanopa).

Gândacul bălos scurtă descriere : Adultul are corpul de 4-4,8 mm lungime, de culoare albastră, cu reflexe metalice verzui. Capul, antenele și tarsele de culoare neagră; pronotul, femurele și tibiile, de culoare roșcată. Elitrele albastre, având striuri, între ele cu puncte dispuse în rânduri longitudinale.. Pentru combatere, puteți aplica unul din produsele :

- KARATE ZEON 0,15 l / ha sau,
- DELTAGRI 0,3 l/ha sau,
- Del CAPS 050 CS(a doua denumire comercială Del TOP 50CS) -0,1 l/ha.

Puteți utiliza și alte produse de protecția plantelor cuprinse în baza de date PEST – EXPERT de pe site-ul M.A.D.R. (www.madr.ro) . Important : folosirea adjuvanților la oricare tratament cu produse ppp de contact sau sistemice efectuat, permite acoperirea rapidă a suprafețelor tratate și influențează pozitiv alipirea soluției pe plante, asigură rezistența la spălarea de către ploi , contribuind în acest fel la creșterea considerabilă a eficacității tratamentelor fitosanitare.

Alte recomandări:

- tratamentele fitosanitare se vor efectua pe vreme liniștită sau la viteze ale vântului cuprinse între 0,5-3 m/sec. La viteze ale vântului mai mari de 3 m/sec. nu se vor efectua tratamente fitosanitare.
- cititi cu atenție toate instrucțiunile de pe eticheta produsului;
- utilizați responsabil toate produsele fitosanitare;
- nu tratați lângă cursurile de apă ,santuri și alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- folosiți numai aparate de stropit în stare perfectă de funcționare , bine reglate și calibrate;
- clătiți de trei ori ambalajele în care au fost ppp și turnați apa de clătire în cuva;
- aplicați pe parcele tratate restul de soluție din cuva , diluata cu apa de clătire;
- spălați aparatele de stropit după fiecare tratament;
- nu deversați apele reziduale lângă cursurile de apă , locuințe.

ATENȚIE!!!!

Având în vedere că sezonul apicol se află în plină activitate, se impune necesitatea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Respectați cu strictețe perioadele de remanență a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr.3242/F/21.10.2016 dintre MADR-ANF și ROMAPIS, Ordinul comun Nr.45/1991/127/68/15B/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociația Crescătorilor de Albine din ROMÂNIA , Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Pentru prevenirea intoxicațiilor la albine, deținătorii de suprafețe agricole și silvice (fermieri/producători agricoli) sunt obligați să anunțe în scris consiliile locale / primăriile cu cel puțin 48 ore înainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit , metoda de aplicare(prăfuire,stropire,aerosoli). Consiliile locale, precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunțe în scris sau telefonic apicultorii care au vatră sau stupină staționară/permanent sau temporară /pastorală cu cel puțin 24 ore înainte de efectuarea de către deținătorii de suprafețe agricole sau silvice (fermieri /producători agricoli), a tratamentelor cu ppp, în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine.



Sef serviciu,

Ing.

Neață Împăratu Ioană

Întocmit

Ing.Șerban Valentina

Oficiul Fitosanitar Vrancea
Str. Milcov, Nr.40, Focșani,
Jud. Vrancea

Telefon/fax 0237210164
E-mail: ofvrancea@anf.ro
Nr. 899 din 26.04. 202

BULETIN DE AVERTIZARE 18
VIȚA DE VIE PĂIANJEN

Acarianul galicol al viței de vie (*Eriophyes vitis*) este printre cei mai întâlniți și periculoși acarieni la vița de vie.

Atacul acarianului galicol pe frunzele viței de vie provoacă bășicarea *Erinoza viței de vie*. În luna aprilie după dez mugurit păianjenii colonizează partea inferioară a frunzei le înțepă și suge sucul celular al frunzelor. Aceștia se înmulțesc rapid fapt ce duce la o hrănire deficitară a plantei cu substanțe nutritive.



Pentru combatere se recomandă:

- BERMECTINE -0,25-1,0 l/ha pentru strugurii de vin și 0,5-1,2 l/ha pentru strugurii de masă sau,
- VERTIMEC 1,8 % EC -0,75-1,0 l/ha sau,
- FLANCO 10 WP- 50g/hl aplicat la apar iția dăunătorului.

Alte recomandări:

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep., pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministerului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici cu utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Șef serviciu

Ing.

Neață Împăratu Ioana



Întocmit,

Ing. Șerban Valentina

4