

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 55 / 28.06.2022

Oficiul Fitosanitar Mureș vă recomandă să aplicați tratamente la **vita de vie**, pentru prevenirea și combaterea simultană a celor 3 boli importante: **mana, făinarea și putregaiul cenușiu**, constituind unul din momentele critice producerii infecțiilor, în special al putregaiului cenușiu.



Pentru combatere vă recomandăm să aplicați una dintre următoarele variante de tratament:

I) Un produs sistemic complex care combate concomitent cele trei boli:

CABRIO TOP	mana, făinarea, putregaiul negru, patarea neagra a vitei de vie	1,5 - 2,0 kg/ha	35 zile
UNIVERSALIS 593 SC	mana viței de vie, făinarea și putregaiul cenușiu - efect secundar	2,0 l/ha (in 1000 l apa)	-
FOLIMORF (Ditan)	mana vitei de vie, putregaiul cenușiu, făinarea	2,0 kg/ha	40 zile

II) Un produs care combate mana și făinarea :

CALIZI (SINPRO)	făinarea, mana	1,0 l/ha	21 zile
-----------------	----------------	----------	---------

-la care se adaugă un produs care combate putregaiul cenușiu:

LUNA PRIVILEGE 500 SC	putregaiul cenușiu	0,5 l/ha (0,05%)	-
CANTUS	putregaiul cenușiu	1,0-1,2 kg/ha	21 zile
KENJA	putregaiul cenușiu	1,5 l/ha	21 zile

III) Un produs care combate făinarea și putregaiul cenușiu:

DYNALI	făinarea, putregaiul negru, boala petelor rosii	0,65 l/ha	21 zile
--------	---	-----------	---------

-la care se adaugă un produs care combate mana :

ARMETIL COBRE (Manoxin Combi)	mana	2,5 kg/ha	21 zile
ALFIL WG/(Alleato WG)	mana	250-300 g/hl apa	28 zile
ZORVEC ZELAVIN/ (Orondis)	mana	0,2-0,6 l/ha	7 zile
TRIUMF 40 WG	mana	2,0-2,5 kg/ha	21 zile
SPHINX EXTRA	mana	1,5-2,0 kg/ha	28 zile

IV) Un produs care combate făinarea:

SERCADIS	Fainare	0,15 l/ha	35 zile
DOMARK 10 EC	Fainare	0,250 l/ha	30 zile
KARATHANE GOLD 350 EC (Karathane Plus)	Fainare	0,5 l/ha	21 zile
FLOSUL	Fainare	4,0 l/ha	5 zile

În parcele cu atac al moliei strugurilor, adaugați în soluția de stropit și un insecticid: AFFIRM -1,5 kg/ha sau PLINTO 2,5 EC (ALFASURE 2,5EC) - 0,4-0,6 l/ha sau CORAGEN - 150-175 ml/ha sau POLECI (DECA 2,5EC) - 40-60 ml/hl apa (0,04-0,06%). Dacă este atac al acarienilor utilizați produsul VERTIMEC 1,8% EC- 0,75-1,0 l/ha care controlează și acarienii.

Alte recomandări: Pentru tratament se pot utiliza și alte produse omologate cu efect similar. La prepararea soluției respectați concentrațiile și dozele recomandate. Respectați informațiile de pe ambalajul produselor folosite. Pentru o eficacitate bună a tratamentului, recomandăm folosirea unei cantități corespunzătoare de soluție la unitatea de suprafață precum și o bună reglare a aparatelor de stropit. Nu aplicați tratamentul dacă insolatia este puternică!!! Verificați recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de ppp! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați normele de lucru cu ppp, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/ 1991 al MAA, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/ 2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu ppp);

Respectați prevederile Ordinului MADR nr. 297/2017 privind Codul bunelor practici pentru utilizarea în siguranță a ppp.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul MADR, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

 SEF SERVICIU
 Dr. ing. Pogăcian Marian

 Intocmit
 Ing. Bologa Vasile

