

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 08 din 13 aprilie 2022

Pentru combaterea **DĂUNĂTORILOR DE SOL**, se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la **LEGUME, PLANTE ORNAMENTALE, PEPINIERE SILVICE** și la culturi de **CARTOF, SOIA** și **MAZĂRE**, cu produse de protecție a plantelor omologate:


- |                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. <b>ERCOLE 10,0 - 15,0 kg/ha</b>                                                                 | <i>sau</i> |
| 2. <b>COROCID SUPER 20,0 kg/ha</b>                                                                 | <i>sau</i> |
| 3. <b>TRIKA EXPERT 10,0 - 15,0 kg/ha</b>                                                           | <i>sau</i> |
| 4. <b>BASAMID GRANULE 250,0 kg/ha</b>                                                              | <i>sau</i> |
| 5. <b>LEBRON 0,5 G 12,0 - 20,0 kg/ha</b> (doză diferențiată pe culturi conform tabelului)          | <i>sau</i> |
| 6. <b>MICROSED GEO (SOBEK UP) 12,0-20,0 kg/ha</b> (doză diferențiată pe culturi conform tabelului) | <i>sau</i> |
- alte produse de protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.*

**Mențiune:** Produsul de protecție a plantelor **BASAMID GRANULE**, este omologat pentru combaterea organismelor dăunătoare mană de sol, fuzarioza și ofilirea vasculară la cultura de tomate (din seră) în doză de 500,0 kg/ha.


**Perioada optimă de tratament:** Tratamentul se va aplica pe suprafețele pe care există rezervă biologică cu organismul /organismele dăunătoare.

| Nr. crt. | Produsul de protecție a plantelor | Cultura                                                                                                                               | Doza omologată kg/ha | Organismele dăunătoare combătute                                | Alte recomandări                                               |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>TRIKA EXPERT</b>               | ardei, cartof, castraveți, dovlecei, plante ornamentale, morcov, pepiniere silvice, salată, soia, tomate, culturi de varzoase, vinete | 10,0 - 15,0          | buha semănăturilor, cărăbușul de mai, viermi sârmă              | Se aplică în sol prin încorporare la semănat sau transplantat  |
| 2.       | <b>MICROSED GEO (SOBEK UP)</b>    | castraveți, conopidă, fasole boabe și verde, mazăre, morcov, ridichi, salată, țelină, varză, vinete                                   | 16,0 - 20,0          | viermi sârmă, buha semănăturilor, puricele sfeclei, muște       | Se aplică în sol prin încorporare la semănat sau transplantat. |
|          |                                   | tomate                                                                                                                                | 16,0 - 20,0          | viermi sârmă, buha semănăturilor, puricele sfeclei, șarpele orb |                                                                |
|          |                                   | cartof                                                                                                                                | 12,0 - 15,0          | viermi sârmă                                                    |                                                                |
|          |                                   | soia                                                                                                                                  | 12,0 - 15,0          | viermi sârmă, buha semănăturilor, puricele sfeclei              |                                                                |
| 3.       | <b>COROCID SUPER</b>              | tomate                                                                                                                                | 20,0                 | coropișniță                                                     | Se aplică în sol prin încorporare la semănat sau transplantat. |
| 4.       | <b>BASAMID GRANULE</b>            | legume din solarii înființate prin răsad                                                                                              | 250,0                | coropișniță                                                     | Se aplică în sol cu încorporare înainte de plantare.           |

|    |                         |                                                                                                                                                                      |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | <b>LEBRON<br/>0,5 G</b> | castraveți, conopidă, fasole,<br>gulii, salată, mărar, mazăre,<br>țelină, tomate, varză, vinete                                                                      | 15,0-20,0 | viermi sârmă, buha<br>semănăturilor, șarpele<br>orb, cărăbușul de mai | Se poate aplica la momentul<br>semănăturii. Produsul poate<br>fi aplicat și ulterior în sol<br>prin grăpare ușoară la 3-5<br>cm. Este permis un singur<br>tratament pe ciclu de<br>vegetație.                             |
|    |                         | cartof                                                                                                                                                               | 12,0-15,0 | viermi sârmă                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                         | soia                                                                                                                                                                 | 12,0-15,0 | viermi sârmă, buha<br>semănăturilor                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. | <b>ERCOLE</b>           | ardei, cartof, castraveți, dovleac,<br>morcov, pepiniere silvice, plante<br>ornamentale, ridichi, rucola,<br>salată verde, soia, spanac,<br>tomate, vărzoase, vinete | 10,0-15,0 | buha semănăturilor,<br>cărăbușul de mai,<br>viermi sârmă              | Se aplică în sol prin<br>încorporare la semănat sau<br>transplantat.<br>Se poate aplica fazial (pe<br>terenurile cu rezerva mare de<br>dăunători - la plantat și în<br>vegetație, la rebilonare sau<br>prașila mecanică). |




Coropîșnița - Adult




Viermi sârmă - Larvă




Cărăbușul de mai - Larvă




Buha semănăturilor - Larvă




Puricele sfeclei - Adulți



Gărgărița - Adult



Șarpele orb - Larve



Musca morcovului  
Larvă, adult

#### Alte recomandări:

Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!  
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor (p.p.p.) se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Acestea se vor depozita în magazine până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile "SCAPA de ambalaje" – [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro).

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sibiu  
Dr. Biol. Livia Dana ALDEA



Responsabil Prognoză și Avertizare  
Cons. sup. Ana TIMAR